

Informativa per il Paziente

Con accesso tramite CUP

Gli **esami di laboratorio**, essenziali per l'effettuazione di esami che prevedano la somministrazione di mezzo di contrasto organo iodato(TC) e a base di gadolinio (RM), sono **azotemia e creatinina** e saranno accettati purché effettuati entro i 30 giorni antecedenti l'esame

In caso di **anamnesi positiva** per:

- Atopia, asma, allergia a cibi e farmaci
- Allergia al lattice
- Trattamento con beta-bloccanti
- Trattamento con interleuchina 2

Il paziente adulto deve fare premedicazione con prednisone 50 mg 13 ore, 7 ore e 1 ora prima della somministrazione, quello pediatrico prednisone 1 mg/kg/die per tre giorni compreso quello dell'intervento **

- Mieloma multiplo idratazione 12 ore prima

In pazienti in terapia con:

- Metformina se eGFR<45 ml/min. devono sospendere 48 ore prima dell'esame e riprendere 48 ore dopo
- Ciclosporina, aminoglicosidi e FANS sospendere almeno 24 ore prima
- Cisplatino, sospendere almeno 7 gg prima
- Neurolettici, analgesici, antistaminici e sedativi del gruppo fenotiazinico sospendere 48 ore prima e riprendere 12 ore dopo l'esame

** Contattare l'UO che deve effettuare la prestazione almeno 7 gg prima in caso di dubbio sul percorso